

Metodiky použití přípravků TS od 2019

Zde jsou navrženy ověřené varianty použití přípravků řady TS při pěstování základních plodin. Vzhledem k různorodosti průběhu počasí a půdních podmínek je variant použití přípravků více. V těchto případech vám poradí naši zkušení obchodní zástupci.

Jarní ječmen

Varianta	Přípravky, dávkování a hlavní účinky			
var. I pro sušší podmínky	přípravek	TS OSIVO	TS IMPULS	TS KVĚTA
	termín a dávka	moření, 0,5 l/tunu osiva	od 3.listu, BBCH 13-24, 0,5 l/ha	od praporcového listu BBCH 51- 73, 0,5 l/ha
	účinek	rychlý start a lepší kořen	tvorba kořenů, odnožování, odolnost proti stresu	stimulace kvetení, zvýšení HTS, snížení N-látka a green efekt
var. II standartní podmínky	přípravek	TS OSIVO	TS EVA	TS VIN
	termín a dávka	moření, 0,5 l/tunu osiva	od 3.listu, BBCH 13-31, 0,5 l/ha	od praporcového listu BBCH 51- 73, 0,1 l/ha
	účinek	rychlý start a lepší kořen	tvorba kořenů, lepší příjem živin, zesílení porostu	podpora kvetení, stimulace příjmu živin




Pšenice ozimá, tritikale


Varianta	Přípravky, termín, dávkování a hlavní účinky			
var.I pro posílení porostu	přípravek	TS OSIVO	TS IMPULS	TS SENTINEL
	termín a dávka	moření, 0,5 l/tunu osiva	od 3.listu, BBCH 13-24, podzim a u slabých porostů jaro, 0,5 l/ha	od praporcového listu, BBCH 51-73, 0,25 l/ha
	účinek	rychlý start a lepší kořen	tvorba kořenů, odnožování, odolnost proti stresu	lepší příjem živin, N-látky, lepší kvalita a hospodaření s vodou
var.II standartní	přípravek	TS OSIVO	TS EVA	TS VIN
	termín a dávka	moření, 0,5 l/tunu osiva	od 3. listu, BBCH 13-31, jarní regenerace, 0,5 l/ha	od praporcového listu, BBCH 51- 73, 0,1 l/ha
	účinek	rychlý start a lepší kořen	tvorba kořenů, lepší příjem živin, zesílení porostu	podpora kvetení a stimulace příjmu živin

Pšenice jarní, oves

Varianta	Přípravky, termín, dávkování a hlavní účinky			
var. I pro silný porost	přípravek	TS OSIVO	TS IMPULS	TS SENTINEL
	termín a dávka	moření, 0,5 l/tunu osiva	od 3.listu, BBCH 13-24, 0,5 l/ha	od praporcového listu, BBCH 51-73, 0,25 l/ha
	účinek	rychlý start a lepší kořen	tvorba kořenů, odnožování, lepší růst a protistres	podpora příjmu živin (N látky) lepší kvalita a hospodaření s vodou
var. II široké použití	přípravek	TS OSIVO	TS EVA	TS VIN
	termín a dávka	moření, 0,5 l/tunu osiva	od 3.listu, BBCH 13-31, 0,5 l/ha	od praporcového listu, BBCH 51-73, 0,1 l/ha
	účinek	rychlý start a lepší kořen	zlepšený příjem živin, zesílení kořenů a porostu	podpora kvetení a příjmu živin a odolnost proti stresu




Ječmen jarní



Pšenice ozimá, tritikale

Řepka ozimá, jarní

Varianta	Přípravky, termín, dávkování a hlavní účinky					
var.I	přípravek	TS OSIVO	TS IMPULS	TS EVA	TS KVĚTA	TS SILVA
standartní	termín a dávka	moření, 2-4 l/tunu osiva	od 4. listu, BBCH 14-30. doporučuje se podzim, 0,5 l/ha	jarní regenerace od BBCH 21, 0,5 l/ha	žluté poupě až konec kvetení, BBCH 39- 69, 0,5 l/ha	v průběhu kvetení od BBCH 50, od TS KVĚTA odstup 14 dní, 0,25 l/ha
	účinek	rychlé vzházení a kořenění rostlin	podpora kořenů a velikosti krčku, indukce postranních pupenů	vyšší příjem živin, zesílení porostu, rozvoj kořenů	podpora kvetení, delší doba kvetení, vyšší HTS semen	posiluje účinky fungicidů (stříbro), posiluje zdravotní stav
var.II	přípravek	TS OSIVO	TS IMPULS		TS VIN	TS SILVA
nová	termín a dávka	moření, 2-4 l/tunu osiva	od 4. listu, BBCH 14-30. doporučuje se podzim, 0,5 l/ha		žluté poupě až konec kvetení, BBCH 39- 69, 0,1 l/ha	v průběhu kvetení od BBCH 50, od TS VIN odstup 14 dní, 0,25 l/ha
	účinek	rychlé vzházení a kořenění rostlin	podpora kořenů a velikosti krčku, indukce postranních pupenů		podpora kvetení a příjmu živin do semen, protistres	posiluje účinky fungicidů (stříbro), posiluje zdravotní stav



Řepka ozimá





Cukrová řepa					
Varianta	přípravky, termín, dávkování a hlavní účinky				
var.I	přípravek	TS OSIVO	TS SENTINEL	TS LICIT	TS SILVA
osvědčená	termín a dávka	moření, 4 l/tunu osiva	od 4. listu, od BBCH 14, 0,25 l/ha	od 6- 10 listu, od BBCH 16 po uzavření řádků, 0,5 l/ha	od 7. listu BBCH 17 spolu s fungicidem, 0,25 l/ha
	účinek	podpora vzházení a zakořenění	odstranění stresu z herbicidů a prostředí, podpora růstu	rozvoj a ochrana listů, vyšší příjem živin, vyšší výnos	zvyšuje odolnost proti chorobám a lepší zdravotní stav
var.II	přípravek	TS OSIVO	TS IMPULS	TS VIN	TS SILVA
nové	termín a dávka	moření, 4 l/tunu osiva	BBCH 12- 17, 0,5 l/ha	od 6- 10 listu, od BBCH 16 po uzavření řádků, 0,1 l/ha	od 7. listu BBCH 17 spolu s fungicidem, 0,25 l/ha
	účinek	podpora vzházení a zakořenění	podpora tvorby kořenů a růstu rostlin	podpora růstu a tvorby kořene, vyšší výnos	zvyšuje odolnost proti chorobám a lepší zdravotní stav

Mák



varianta	přípravky, termín, dávkování a hlavní účinky				
var.I	přípravek	TS OSIVO	TS IMPULS	TS KVĚTA	TS SILVA
	termín a dávka	moření osiva, 10- 14 l na tunu osiva	od 6. listu, BBCH 16- 52, 0,5 l/ha	fáze háčkování, BBCH 57- 65, 0,5 l/ha	od květního pupenu, BBCH 51- 71, 0,25 l/ha
	účinek	podpora vzházení a zakořenění	tvorba kořenů, zesílení porostu a podpora růstu	podpora kvetení, vyšší kvalita pylu a HTS	vyšší práh tolerance k chorobám, ozdravný účinek
var.II	přípravek	TS OSIVO	TS IMPULS	TS VIN	TS SILVA
	termín a dávka	moření osiva, 10- 14 l na tunu osiva	od 6. listu, BBCH 16- 52, 0,5 l/ha	od tvorby pupenu, BBCH 53- 71, 0,1 l/ha	od květního pupenu, BBCH 51- 71, 0,25 l/ha
	účinek	podpora vzházení a zakořenění	tvorba kořenů, zesílení porostu a podpora růstu	podpora kvetení, stimuluje tvorbu semen a vyšší HTS	vyšší práh tolerance k chorobám, ozdravný účinek







Kukuřice, Slunečnice

varianta	přípravky, dávkování a hlavní účinky			
var.I na zrno	přípravek	TS OSIVO	TS IMPULS	TS KVĚTA
	termín a dávka	moření osiva, 2 l/tunu osiva	od 6. listu, BBCH 22- 26, 0,5 l/ha	počátek metání u kukuřice a zač. kvetení u slunečnice od BBCH 39, 0,5 l/ha
	účinek	podpora vzcházení a kořenění	rozvoj kořenů, podpora růstu a proti stresu	stimuluje kvalitu kvetení, prodlužuje dobu kvetení, vyšší HTS
var.II na siláž	přípravek	TS OSIVO	TS SAMSON	TS LICIT
	termín a dávka	moření osiva, 2 l/tunu osiva	od 6. listu, BBCH 22- 35, 0,75 l/ha	od BBCH 24- 53, prodlužovací růst až počátek metání, 0,5 l/ha
	účinek	podpora vzcházení a kořenění	podpora růstu rostlin, intenzivní růst	vyšší příjem živin, tvorba chlorofylu, tvorba listové plochy




Soja

varianta	přípravky, termín, dávkování a účinky			
var.I	přípravek	TS OSIVO	TS SAMSON	TS KVĚTA
	termín a dávka	moření osiva, 1 l/tunu osiva	listy na druhém kolénku, BBCH 31-60, 0,75 l/ha	začátek květu, BBCH 60- 70, 0,5 l/ha
	účinek	lepší vzcházení a zakořenění	intenzivní růst, vyšší nasazení spodního patra	lepší kvetení, zvyšuje příjem živin do zrna
var.II	přípravek	TS OSIVO	TS IMPULS	TS VIN
	termín a dávka	moření osiva, 1 l/tunu osiva	od prvního kolénka, BBCH 20- 40, 0,5 l/ha	před začátkem kvetení, BBCH 40- 70, 0,1 l/ha
	účinek	lepší vzcházení a zakořenění	podporuje kořenění, růst a nasazení lusků	podporuje nasazení plodů, vyšší příjem živin, vyšší výnos



Brambory

varianta	přípravky, termín, dávkování a účinky			
var.I	přípravek	TS IMPULS	TS LICIT	TS SILVA
	termín a dávka	mladé rostliny až do zapojení řádků, 0,5 l/ha	po zapojení řádků, 0,5 l/ha	v průběhu celé vegetace, 0,25 l/ha
	účinek	rozvoj kořenů, stolonů a nasazení hlíz	stimulace růstu listové plochy, růst hlíz	zvýšený práh odolnosti proti chorobám
var.II	přípravek	TS IMPULS	TS VIN	TS SILVA
	termín a dávka	mladé rostliny až do zapojení řádků, 0,5 l/ha	před zapojením řádků, 0,1 l/ha	v průběhu celé vegetace, 0,25 l/ha
	účinek	rozvoj kořenů, stolonů a nasazení hlíz	nasazení hlíz, příjem živin, odolnost proti stresu	zvýšený práh odolnosti proti chorobám



Zelenina obecně

varianta	přípravky, termín, dávkování a účinky				
var.I listová a kořenová zelenina	přípravek	TS OSIVO	TS IMPULS	TS LICIT	TS SILVA
	termín a dávka	při moření osiva, 0,1/ha	na mladé rostliny, 0,5 l/ha	v období hlavního růstu, 0,5 l/ha	v průběhu celé vegetace, 0,25 l/ha
	účinek	lepší vzházení a zakořenění	rozvoj kořenů, lepší příjem živin, proti stresu	podpora fotosyntézy, pro zdravý a větší list	odolnost rostlin proti chorobám (stříbro)
var.II plodová zelenina	přípravek	TS OSIVO	TS IMPULS	TS KVĚTA	TS SILVA
	termín a dávka	při moření osiva, 0,1/ha	na mladé rostliny, 0,5 l/ha	v období před květem a v průběhu kvetení, 0,5 l/ha	v průběhu celé vegetace, 0,25 l/ha
	účinek	lepší vzházení a zakořenění	rozvoj kořenů, lepší příjem živin, proti stresu	lepší kvetení, kvalita a velikost plodů	odolnost rostlin proti chorobám (stříbro)

Zastoupení pro české kraje:

A-V Stimul s.r.o

web: www.avstimul.cz

e-mail: lochman@avstimul.cz
lochmanova@avstimul.cz




A-V Stimul- Luboš Bajer
725 853 860



A-V Stimul-Anna Lochmanová
739 589 564



A-V Stimul- 739 589 554
Ing. Václav Lochman



A-V Stimul-Ivana Sulková 604 548 888
A-V Stimul-Jan Hošna 603 825 944



Morava zastoupena
Trisol.farm s.r.o

**stimul**

