

Metodiky použití přípravků TS od 2020

Zde jsou navrženy ověřené postupy pro jednotlivé plodiny a zároveň je uvedena metodika univerzální (levná) s využitím nového přípravku **TS VIN**. Variant je mnohem více v závislosti na stavu porostu a průběhu počasí. V konkrétních případech se obraťte přímo na naše obchodní zástupce.

Univerzální postup - jednoduchá metodika (nejlevnější)

Charakteristika a fáze porostu	Přípravek	Doporučená dávka	Účinek a vliv na porost
moření osiva	TS OSIVO	dle plodiny	podpora vzházení a zakořeňování
mladé rostliny	TS IMPULS	0,5 l/ha	tvorba kořenů, podpora růstu, podpora násady květů a větvení
v průběhu vegetace až do kvetení	TS VIN	0,1 l/ha	podpora růstu mladých rostlin, vliv na kořenový systém, stimulace kvetení a rovnoměrné dozrávání
v průběhu vegetace s fungicidem	TS SILVA	0,25 l/ha	ozdravný účinek, posílení účinku fungicidu

Ječmen jarní



Charakteristika a fáze porostu	Přípravek	Doporučená dávka	Účinek a vliv na porost
Moření osiva	TS OSIVO	0,5 l/tunu osiva	lepší příjem vody a živin, rychlý start a lepší zakořeňování
Od 3 listů do odnožování BBCH 13-24	TS IMPULS alternativně	0,4- 0,5 l/ha	tvorba kořenů včetně kořenového vlášení, podpora odnožování
Od 3 listů až do sloupkování BBCH 13- 31	TS EVA	0,4- 0,6 l/ha	tvorba kořenů a lepší příjem živin během vegetace, zesílení porostu
konec odnožování BBCH 29-31	TS IMPULS	0,5 l/ha	redukce neproduktivních odnoží a vyrovnaní porostu
Praporcový list až mléčná zralost BBCH 51- 73	TS KVĚTA	0,4- 0,6 l/ha	stimulace kvetení, zvýšení HTS, lepší příjem živin, snížení N látek



Pšenice ozimá, tritikale



Charakteristika a fáze porostu	Přípravek	Doporučená dávka	Účinek a vliv na porost
moření osiva	TS OSIVO	0,5 l/tunu osiva	lepší příjem vody a živin, rychlý start a výborné zakořeňování
od 3. listu do poloviny odnožování BBCH 13- 24 (na podzim)	TS IMPULS	0,4 l/ha	tvorba kořenů, zesílení porostu a podpora odnožování
jarní regenerace až po sloupkování BBCH 13- 31	TS EVA	0,4- 0,6 l/ha	podpora příjmu živin, zakořeňování, posílení porostu, proti stresu
konec odnožování BBCH 29-31 (alternativně)	TS IMPULS alternativně	0,5 l/ha	redukce neproduktivních odnoží, vyrovnaný a zesílený porost
praporcový list až poč.mléčné zralosti, BBCH 51- 73	TS SENTINEL	0,25 l/ha	podpora příjmu N látek, zlepšení kvality, hospodaření s vodou




Pšenice jarní, oves

Charakteristika a fáze porostu	Přípravek	Doporučená dávka	Účinek a vliv na porost
moření osiva	TS OSIVO	0,5 l/tunu osiva	lepší příjem vody a živin, rychlý start a bohatý kořenový systém
od 3.listu do poloviny odnožování BBCH 13- 24	TS IMPULS alternativně	0,4- 0,5 l/ha	podpora vývoje kořenů, podpora odnožování a zesílení porostu
od 3.listu až do počátku sloupkování BBCH 13- 31	TS EVA	0,4- 0,6 l/ha	lepší příjem živin, silný porost, tvorba kořenů, proti stresu
praporcový list až k mléčné zralosti	TS SENTINEL	0,25 l/ha	podpora příjmu N látek, kvalita zrna, protistresové účinky





ŘEPKA

Charakteristika a fáze porostu	Přípravek	Doporučená dávka	Účinek a vliv na porost
moření osiva	TS OSIVO	2- 4 l/tunu osiva	rychlé vzházení a zakořenění rostlin, podpora růstu
od 4.listu po dlouhivý růst BBCH 14- 30	TS IMPULS	0,4- 0,6 l/ha	tvorba kořenů včetně vlášení, silný kořenový krček, indukce postranních pupenů, vyšší mrazuvzdornost
jarní regenerace, od BBCH 21	TS EVA	0,4- 0,6 l/ha	vyšší příjem živin, zesílení porostu, rozvoj kořenů, odolnost k chladu
od žluté poupě až konec kvetení BBCH 39- 69	TS KVĚTA	0,4- 0,6 l/ha	podpora kvetení, lepší příjem živin, stimuluje tvorbu semen, vyšší HTS
začátek kvetení až konec kvetení od BBCH 50 (mezi TS KVĚTA A TS SILVA odstup 14 dní)	TS SILVA se stříbrem	0,25 l/ha	výrazně posiluje zdravotní stav rostlin a spolu s fungicidem zajišťují potřebnou ochranu



Kukuřice, Slunečnice

Charakteristika a fáze porostu	Přípravek	Doporučená dávka	Účinek a vliv na porost
moření osiva	TS OSIVO	2 l/tunu osiva	podpora vzházení a dobré zakořenění
zač. prodlužovacího růstu cca od BBCH 22- 35	TS SAMSON	0,4- 0,6 l/ha	intenzivní růst porostu, tvorba výnosu
zač. prodlužovacího růstu cca od BBCH 22- 35 (alternativně)	TS LICIT	0,4- 0,6 l/ha	intenzivní nárůst listové plochy a porostu (potřeba dostatek vody)
počátek metání u kukuřice, počátek kvetení u slunečnice, od BBCH 39	TS KVĚTA	0,4- 0,6 l/ha	stimuluje kvalitu kvetení, zvyšuje HTS a zvyšuje kvalitu





Cukrová řepa

Charakteristika a fáze porostu	Přípravek	Doporučená dávka	Účinek a vliv na porost
moření osiva	TS OSIVO	4 l/tunu osiva	start a zakořenění
od 4. listu BBCH 14	TS SENTINEL	0,25 l/ha	odstranění stresu z herbicidů a prostředí, podpora růstu rostlin
od 6. listu BBCH 16 do uzavření řádků	TS LICIT	0,4- 0,6 l/ha	rozvoj a ochrana listové plochy, zvyšující výkon fotosyntézy, vyšší příjem živin, vyšší výnos
od 7. listu BBCH 17 spolu s fungicidem	TS SILVA	0,25 l/ha	zlepšení zdravotního stavu, odolnost proti chorobám
samostatně	TS SILVA	0,5- 0,6l/ha	při bakteriózách na listech
polovina července	TS KVĚTA	0,4- 0,6 l/ha	vyšší cukernatost





Mák

Charakteristika a fáze porostu	Přípravek	Doporučená dávka	Účinek a vliv na porost
moření osiva	TS OSIVO	10 l/ tunu osiva	podpora vzcházení a zakořenění
od 6. listu BBCH 17- 52	TS IMPULS	0,4- 0,6 l/ha	tvorba kořenů, podpora růstu, zesílení porostu, proti stresu
fáze háčkování od BBCH 57- 65	TS KVĚTA	0,4- 0,6 l/ha	podpora kvetení, kvalita pylu, zvýšení HTS
od květního pupenu BBCH 51- 71 s fungicidem	TS SILVA se stříbrem	0,25 l/ha	ozdravný účinek, vyšší práh tolerance k chorobám



Soja

Charakteristika a fáze porostu	Přípravek	Doporučená dávka	Účinek a vliv na porost
moření osiva	TS OSIVO	1 l/tunu osiva	podpora vzcházení, zakořenění a vyšší příjem vody a živin
listy na druhém kolénku cca od BBCH 31- 60	TS SAMSON	0,4- 0,6 l/ha	intenzivní růst, vyšší nasazení spodního patra lusků
začátek květu , od BBCH 60- 70	TS KVĚTA	0,4- 0,6 l/ha	zvyšuje příjem živin do zrna, kvalita kvetení a vyšší HTS



Brambory

Charakteristika a fáze porostu	Přípravek	Doporučená dávka	Účinek a vliv na porost
příprava sadby - hlízy krátce namočit	TS IMPULS	0,5% roztok	rozvoj kořenů a podpora růstu
mladé rostliny až do zapojení porostu	TS IMPULS	0,5 l/ha	rozvoj stolonů a nasazení hlíz
po zapojení řádků	TS LICIT	0,5 l/ha	stimulace růstu listové plochy, zvýšení fotosyntézy, ukládání zásobních látek
během vegetace	TS SILVA	0,25 l/ha	ochrana proti chorobám



Cibule

Charakteristika a fáze porostu	Přípravek	Doporučená dávka	Účinek a vliv na porost
osivo- moření	TS OSIVO	10 l/tunu osiva	lepší start a zakořenění rostlin
sazečka- namáčení v roztoku	TS OSIVO	0,5 % roztok	zakořenění rostlin a vyrovnaný růst
mladé rostliny	TS IMPULS	0,5 l/ha	podpora kořenů a růstu rostlin
hlavní růst	TS SAMSON	0,5 l/ha	podpora nárůstu hmoty
během vegetace	TS SILVA	0,25 l/ha	zvyšuje účinnost fungicidů, zvyšuje práh odolnosti proti chorobám

Zelenina obecně

Charakteristika a fáze růstu	Přípravek	Doporučené dávkování	Účinek a vliv na porost
moření osiva	TS OSIVO	0,1 l/ha výsevu	zlepšuje vzházení a zakořenění rostlin
mladé rostliny	TS IMPULS	0,5 l/ha	rozvoj kořenové soustavy, lepší start, lepší příjem živin
hlavní růst	TS LICIT	0,5 l/ha	podpora růstu listové plochy, vyšší výkonost fotosyntézy
plodová zelenina- kvetení	TS KVĚTA	0,5 l/ha	lepší kvetení, nárůst a kvalita plodů



Poradenství a prodej přípravků TS pro české kraje:

A-V Stimul s.r.o.

web:

www.avstimul.cz

e-mail:

lochman@avstimul.cz

lochmanova@avstimul.cz




A-V Stimul- Luboš Bajer
725 853 860



A-V Stimul-Anna Lochmanová
739 589 564



A-V Stimul- 739 589 554
Ing. Václav Lochman



Morava zastoupena
Trisol.farm s.r.o



A-V Stimul-Ivana Sulková 604 548 888
A-V Stimul-Jan Hošna 603 825 944

